

# Reptileshop Repticura

Ouddeelstraat 6a-23  
8936 AX Leeuwarden  
tel. 06-52563154 / 058-2804506  
postadres: Utein 28  
9244 AB Beetsterzwaag  
KvK: 55730205  
BTW nr: NL 089166486B01  
www.repticura.nl  
email: info@repticura.nl



## Aphonopelma seemanni

**Nederlandse naam:** Zebravogelspin  
**Duitse naam:** Gestreifte Guatemala-Vogelspinne  
**Engelse naam:** Costa rican zebra / Costa Rican striped knee

### **Plaats in het dierenrijk:**

**Stam:** Arthropoda (geleedpotigen)  
**Onderstam:** Chelicerata (chelicerendragers)  
**Klasse:** Arachnidae (spinachtigen)  
**Orde:** Araneae (echte spinnen)  
**Suborde:** Orthognatha (vogelspinachtigen)  
**Familie:** Theraphosidae (echte vogelspinnen)  
**Onderfamilie:** Grammostolinae

**Lengte:** Tot maximaal 8 cm.  
**Herkomst:** De zebravogelspin komt voor in Midden-Amerika  
**Terrariumtype:** De bakgrootte dient minimaal 30 x 15 x 15 cm te zijn voor een volwassen spin. De bodemgrond kan bestaan uit een mengsel van 50% potgrond (of turfmolm) en 50 % zand. De bodemlaag moet minstens 5 cm dik zijn. Klei- korrels zijn eventueel ook te gebruiken, maar dan dient wel voor een goede schuilgelegenheid te worden gezorgd, die niet kan instorten. Van stenen en/of schors moet in ieder geval een schuilgelegenheid worden gebouwd. Planten kunnen worden toegevoegd, maar gebruik in geen geval cactussen.

**Temperatuur:** ca. 25 - 26 C (dagtemperatuur)  
ca. 18 C (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Insecten. Sprinkhanen, krekels, e.d. kunnen als levend voer worden aange- boden. De grootte van de voedseldieren aanpassen aan de grootte van de spin. Ook levende nestmuizen worden geaccepteerd. Niet genuttigde voed- seldieren na een dag verwijderen. Spinnen die op het punt staan te vervellen, moeten niet worden gevoerd. De voed- seldieren kunnen de spin direct na de vervelling aanvreten. De spin vervelt binnen 1 à 2 weken als het achterlijf van kleur verandert (van bruin/beige naar blauw zwart).

**Water:** De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. De bak mag goed vochtig worden. Daarom regelmatig sproeien, maar nooit op de spin. Een hoge vochtig- heidsgraad is aan te bevelen, als de bak maar goed ge- ventileerd is. Te droge lucht kan problemen geven bij de vervelling.

**Voortplanting:** De eieren (100 tot 1000) worden gelegd in een cocon.  
**Overige opmerkingen:** Oude naam is *Rhechostricta seemanni*. Een nogal zenuwachtige spin, die graag graaft. Is een zogenaamde 'bombardeer-spin': afgeworpen brandharen van het achterlijf kunnen de huid en slijmvliezen flink irriteren. Komt voor in tinten van chocoladebruin tot bijna zwart.